



NAFIDA

СОРТ КАРТОПЛІ НА КРОХМАЛЬ І ПЛАСТИВЦІ

- Пізній сорт.
- Дуже сильнорослий сорт, який поєднує високу валову продуктивність із високим урожаєм крохмалю.
- Дуже хороша продуктивність в умовах водного стресу. Сорт дуже стійкий до надсікання.
- Сорт з високою в'язкістю при трансформації.
- Висока врожайність.

| РОСЛИНА ТА БУЛЬБИ | | СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Група стиглості | Пізня | Фітофтороз бадилля | Висока |
| Схожість | Достатньо швидка | Фітофтороз бульб | Висока |
| Розвиток рослини | Достатньо швидкий | Ямчата парша | Достатньо висока |
| Колір шкіри | Червоно-Жовтий | Сітчаста парша | Достатньо висока |
| Колір м'якоті | Блідо-Жовтий | Вірус Y(PVY) | Висока |
| Форма бульби | Круглий | Нематода PCN G.Rostochiensis (Ro1-4) | Імунна |
| Однорідність форми | Середня | Нематода PCN G.Pallida (Pa2-3) | Висока |
| Залягання вічок | Глибоке | Рак картоплі pathovar 1-2 | Імунна |
| Розмір бульби | Великий | | |
| ЯКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ | | ФІЗІОЛОГІЯ | |
| Врожайність | Висока | Період спокою | Довгий |
| Вміст сухої речовини | Висока 25,5-26,5 DM% UWW 480-500 | Зовнішні пошкодження | Достатньо стійкий |
| Крохмаль | 19-20% | Внутрішні пошкодження | Достатньо стійкий |
| Потемніння м'якоті | Відсутнє | Внутрішня залізна плямистість | Висока |
| Забарвлення при збиранні | Гарне | Стійкість до проростання | Достатньо стійкий |
| Лежкість | Висока | | |

