



TOPAZE

СТОЛОВИЙ СОРТ

- Дуже високий потенціал врожайності, стабільний результат у різних умовах вирощування.
- Великі бульби з червоною шкіркою та блідо-жовтою м'якоттю.
- Швидка схожість, термін дозрівання від середньо-раннього до середнього.
- Середній період спокою, придатний для переробки як під час сезону, так і після закінчення.

РОСЛИНА ТА БУЛЬБИ		СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	
Група стиглості	Середньо-рання	Фітофтороз бадилля	Середня
Схожість	Швидка	Фітофтороз бульб	Низька
Розвиток рослини	Швидкий	Ямчата парша	Висока
Колір шкіри	Червоний	Вірус Yntn (PVYntn)	Висока
Колір м'якоті	Блідо-жовтий	Нематода PCN G.Rostochiensis (Ro1-4)	Імунна
Форма бульби	Овальна	Нематода PCN G.Pallida (Pa2-3)	Сприйнятлива
Однорідність форми	Висока		
Залягання вічок	Неглибоке		
Розмір бульби	Великий		
Кількість бульб	Велика		
ЯКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ		ФІЗІОЛОГІЯ	
Врожайність	Достатньо висока	Період спокою	Середній
Вміст сухої речовини	Середній 18-20 DM% UWW 325-365	Зовнішні пошкодження	Стійкий
Кулінарний тип	A-B	Внутрішні пошкодження	Середній
Розварювання	Слабке	Внутрішня заліzysta плямистість	Середній
Потемніння м'якоті	Слабке	Стійкість до проростання	Стійкий
Лежкість	Середня		

